

Maxforce®

IC

Kullanıma Hazır Hamamböceği Yemi



Etkili ve Uzun Süreli Kontrol

- **Maxforce® IC**, tüm hamamböceği türlerine karşı etkilidir.
- Her bir damlacık, binlerce hamamböceğini öldürecek güçtedir.
- Uygulamadan sonra 3 ay etkilidir.

Hızlı Etki

- **Maxforce® IC**, hamamböceklerine karşı yüksek çekici özelliğindedir.
- Uygulamadan hemen sonra hamamböcekleri yemi yemeye başlar. İlk belirtiler 10 dakika içinde görülür.
- Uygulamayı takiben 24 saat içinde ölü hamamböcekleri görülür ve 3-5 gün içinde kontrol sağlanır.

"İkinci Etki" özelliği

- Hayatta kalan hamamböceklerinin, ölü hamamböceklerini veya dışkılarını yemesi ile imidacloprid bir hamamböceğinden diğerine geçebilir.
- "İkinci etki" özelliği sayesinde tam kontrol sağlar.



Kolay Uygulama

- **Maxforce® IC**, kullanıma hazırdır, direkt uygulanabilir. Özel uygulama aparatı gerektirmez.
- Uygulama yapılan alanın boşaltılmasına gerek yoktur, günün herhangi bir zamanında uygulama yapılabilir.
- Kontrollü ve hedefe uygulama yapılmasını sağlar.
- Pratik olarak uygulanabilir.
- Optimum uygulama dozuna sahiptir (0.1 g/m²).

Kullanımı onaylanmış

- **Maxforce® IC**, Avrupa Birliği'nce toksisite açısından sınıflandırılmamaktadır.
- Hedef dışı canlıların kazayla yemesini önleyen **Bitrex®** maddesi içerir, yüksek güvenilirliğe sahiptir.
- Kokusuz ve su bazlıdır, yağlı bileşikler içermez. Diğer yem formülasyonlar gibi leke ve görünür kalıntı bırakmaz.
- Hassas alanlar için idealdir (elektrikli ve elektronik ekipmanların çevresi, vb).



Maxforce® IC, %2.15 w/w oranında imidacloprid aktif maddesi içeren kullanıma hazır hamamböceği yemidir.

Imidacloprid, yaygın insektisitlerden farklı etki şekline sahiptir. Haşerelerin merkezi sinir sisteminde çok spesifik bir alana etki ettiğinden hamamböceklerinin bağışıklık (resistans) geliştirme riski yoktur.

Uygulama



HAMAMBÖCEĞİ TÜRLERİ	0.1 GRAMLIK DAMLACIK UYGULAMASI / m ²	
	Düşük hamamböceği istilası	Yüksek hamamböceği istilası
Alman hamamböceği	1 damlacık	2 damlacık
Oriental hamamböceği Amerikan hamamböceği	2 damlacık	3 damlacık



Düşük Hamamböceği İstilası: Hamamböcekleri gün içerisinde nadiren görülür.

Yüksek hamamböceği İstilası: Hamamböcekleri gün içerisinde sıkça görülür.

Maxforce® IC, hamamböceklerinin yuvalarına ve etrafına (köşelere, duvar kenarlarına, çatlaklara, yarıklara vb). şırıngasının arkasından bastırılarak uygulanır. Uygulama miktarı, istilaya uğrayan binanın toplam zemin alanına bağlı olarak tespit edilir. Jel uygulaması yapılmış noktalar düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerekiyorsa uygulama tekrar edilmelidir.



Bayer Environmental Science

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
FSM Mah. Balkan Cad. No: 53
Ümraniye 34770 İstanbul
Tel: (0216) 528 36 00 Faks: (0216) 528 37 87
www.bayercropscience.com.tr



Bayer Environmental Science
A Business Operation of Bayer CropScience

Kullanıma Hazır Hamamböceği Yemi



Maxforce[®]
IC



Bayer Environmental Science
A Business Operation of Bayer CropScience